



Vlaanderen  
is zorg



## ما هو فحص الأشخاص الذين لهم احتكاك بالمريض؟

يتم فحص الأشخاص الذين لهم احتكاك بمريض السل الرئوي المعدي لمعرفة إذا ما قد أصيبوا بالعدوى من المرضى الذين يعانون من السل أو إذا ما كانوا مرضى. ويشتمل الفحص على اختبار السل بفحص الجلد و/أو إجراء فحص بالأشعة السينية على الصدر.

ويجب أيضًا أن يتم فحص الأشخاص الذين لهم احتكاك مستمر بالشخص المصاب وذلك لاكتشاف مصدر العدوى.

للحصول على المزيد من المعلومات، يتعين زيارة طبيبك الخاص أو الاتصال بـ (مراقبة الصحة العامة) أو (الجمعية الفلمنكية لرعاية الصحة التنفسية والسل)

### مراقبة الصحة العامة

\ أنتيويرين: 03 224 62 04  
\ ليمبورج: 011 74 22 40  
\ أوست - فلانديرن: 016 66 63 50  
\ فلانمز - برابانت: 09 276 13 80  
\ ويست - فلانديرن: 050 24 79 00  
[www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be)

### الجمعية الفلمنكية لرعاية الصحة التنفسية والسل

\ أنتيويرين: 03 287 80 10 - 014 41 13 62  
\ ليمبورج: 011 22 10 33  
\ أوست - فلانديرن: 016 33 25 25  
\ فلانمز - برابانت: 09 225 22 58  
\ ويست - فلانديرن: 059 70 26 85  
[www.vrgt.be](http://www.vrgt.be)

v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

## اختبار السل بفحص الجلد

AGENTSCHAP  
ZORG & GEZONDHEID

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid  
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL  
[www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be)



## النتيجة سلبية

ويستحسن في الحالات الأكيدة أخذ الدواء لمدة ستة إلى تسعة أشهر مما يقلل خطر تطور السل لاحقًا بنسبة 80%.

بمجرد أن تُظهر الأشعة السينية على الصدر آثار السل ستطالب ببداية العلاج. ويجب عند ذلك أخذ ثلاثة منتجات دوائية أو أكثر بانتظام لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

إذا فشلت نتيجة الاختبار في إظهار رد فعل واضح على ذراعك، فهذا يعني عامة أنك غير مصاب بالبكتريا الدرنية.

وفي بعض الأحيان يجب إجراء اختبار تحكم بعد مرور شهرين.

اختبار السل بفحص الجلد هو عبارة عن (اختبار مانتوكس أو اختبار انتراديرمال) يتم إجراؤه لمعرفة إذا ما كان شخص ما مصابًا بالبكتريا الدرنية (بكتريا كوش) التي تسبب السل أم لا. وعادة ما يأخذ المرض شكل السل الرنوي كما يؤثر المرض أحيانًا على الكلى والعظام والمخ والغدد والأعضاء الأخرى.

## النتيجة غير مؤكدة


قد يكون رد الفعل عبارة عن منطقة صغيرة مرتفعة ذات لون شاحب.

وفي حالة وجود شك في الاختبار، فيجب إجراؤه مرة أخرى (عادة بعد مرور شهرين).

## كيف يتم إجراء اختبار السل بفحص الجلد؟

يتم حقن كمية صغيرة من السائل (السلين) في جلد ساعدك. ويتم اختبار النتيجة بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من الاختبار. وهذا الاختبار ليس خطيرًا ويمكن إجراؤه للأطفال أو المرأة الحامل.

## اختبار السل بفحص الجلد الإيجابي



## النتيجة إيجابية

إذا تشكل رد الفعل في شكل منطقة مرتفعة متصلبة بجلد الساعد، فذلك يعني أنك مصاب بعدوى من شخص مصاب بالسل.

وإذا كانت النتيجة إيجابية سيطلب منك إجراء أشعة سينية لمعرفة إذا ما كان السل قد تطور أم لا. وإذا لم تُظهر الأشعة السينية شيئًا غير عادي، عند ذلك تكون مصابًا بعدوى المرض ولكنك لست مريضًا أو معديًا للآخرى.

