

aan de huisartsen in Vlaanderen

Contactpersoon	E-mail	Telefoon
	infectieziekten@zorg-en-gezondheid.be	
Ons kenmerk	Uw kenmerk	Datum
hepA		04.08.2017

Informatie en adviezen over hepatitis A

Geachte collega,

Sinds februari 2016 ontwikkelt er zich een toenemende uitbraak van hepatitis A bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Europa. Deze toename merken we eveneens in Vlaanderen op sinds januari 2017. Het aantal gevallen gelinkt aan deze risicogroep loopt momenteel op tot 82. Dit is echter een onderschatting gezien sommigen de ziekte asymptomatisch doormaken of geen arts raadplegen. Gezien de besmettelijkheid en de feco-orale transmissiewijze is de verdere verspreiding buiten de MSM-populatie zeer goed mogelijk. Het serotype dat op Europees niveau circuleert, vindt men ook reeds terug buiten de risicogroep.

Om deze uitbraken in te dijken roepen we u op om uw MSM patiënten te vaccineren voor hepatitis A zoals aanbevolen door de [Hoge Gezondheidsraad](#) en [ECDC](#). Wij adviseren u momenteel niet te vaccineren met een combinatievaccin tegen hepatitis A en hepatitis B, omdat dit een tragere immunrespons geeft. Voor volledige vaccinatie met het enkelvoudig vaccin tegen hepatitis A zijn maar 2 dosissen nodig. De vaccins voor deze aanbevolen preventie van hepatitis A in de MSM risicogroep zitten niet in de korf gratis aangeboden vaccins van de Vlaamse overheid. Wel voorzien de meeste mutualiteiten een gedeeltelijke compensatie in het kader van de aanvullende ziekteverzekering, met een maximumbedrag per jaar. Als de 2 vaccinaties aangekocht worden in verschillende kalenderjaren, kan men toch de kostprijs drukken.

Verder is het van belang om een hepatitis A infectie tijdig te herkennen en te melden bij het [Team Infectieziektebestrijding in uw provincie](#).

Zoals u weet, presenteert de ziekte zich initieel met malaise, griep, koorts, gebrek aan eetlust, misselijkheid en buikklachten. Na enkele dagen kan icterus, donkere urine en soms mastiekverfkleurige feces ontstaan. Vermoeidheid en vermagering komen vaak voor. Een patiënt is besmettelijk vanaf een week voor tot een week na het begin van de icterus.


Om secundaire gevallen te voorkomen wordt aanbevolen om zo vlug mogelijk (en tot 2 weken na optreden icterus) gezinsleden, seksuele contacten en personen die dezelfde toiletvoorziening gebruiken een vaccinatie als postexpositieprofylaxe aan te bieden.

Aangezien hepatitis A feco-oraal wordt overgedragen zijn hygiënische maatregelen eveneens belangrijk om overdracht naar anderen te voorkomen.

Meer informatie over hepatitis A kan u terugvinden in onze [richtlijn](#).

Vriendelijke groeten,

Voor het afdelingshoofd, afwezig,



Dirk Wildemeersch
Teamverantwoordelijke infectieziektebestrijding en vaccinatie

BIJLAGE: Contactgegevens infectieziektebestrijding en vaccinatie van het agentschap Zorg en Gezondheid

Bijlage: Diensten infectieziektebestrijding in de verschillende provincies**Antwerpen**

Dr. Wim Flipse
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 31, 2018 Antwerpen
Tel. 03 224 62 06 – Fax 03 224 62 01
E-mail: wim.flipse@zorg-en-gezondheid.be

Limburg

Dr. Annemie Forier
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt
Tel. 011 74 22 42 – Fax 011 74 22 59
E-mail: anmarie.forier@zorg-en-gezondheid.be

Oost-Vlaanderen

Dr. Naïma Hammami
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 55, 9000 Gent
Tel. 09 276 13 70 – Fax 09 276 13 85
E-mail: naïma.hammami@zorg-en-gezondheid.be

Vlaams-Brabant

Dr. Wouter Dhaeze
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 52, 3000 Leuven
Tel. 016 66 63 53 – Fax 016 66 63 55
E-mail: wouter.dhaeze@zorg-en-gezondheid.be

West-Vlaanderen

Dr. Valeska Laisnez
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2 bus 53, 8200 Brugge
Tel. 050 24 79 15 – Fax 050 24 79 05
E-mail: valeska.laisnez@zorg-en-gezondheid.be

Voor het dringend melden van infectieziekten kunt u **buiten de kantooruren** de dienstdoende arts infectieziektebestrijding bereiken op het nummer **02 512 93 89**.