

Samenvatting richtlijn: Dengue

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	<p>Ongeveer 40-80% van de geïnfecteerden is asymptomatisch.</p> <p>Het overgrote deel van de geïnfecteerde personen met symptomen heeft milde verschijnselen als plots opkomende koorts, hoofdpijn (periorbitaal), spier- en gewrichtspijn en maculair exantheem op de eerste en tweede dag. Daarna gastrointestinale en respiratoire klachten. Met het dalen van de temperatuur verschijnt een tweede exantheemfase (morbilliform op romp en later op ledematen en gezicht, niet jeukend).</p> <p>Een klein percentage vertoont een ernstig verloop, met dengue hemorragische koorts of dengue shock syndroom.</p>
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> > Serologisch: IgG- en IgM-antistoffen vanaf de 5e tot 7e ziektedag, tweede staal voor opvolging IgM met 14 dagen interval (mogelijke kruisreactie). > Dengue NS1-antigeen in serum tijdens de eerste 7 ziektedagen aantoonbaar. > Detectie van dengue-RNA in serum of plasma met PCR is alleen mogelijk tijdens de eerste ziektedagen.
Incubatieperiode	Twee tot vijftien dagen (meestal vijf tot zeven).
Besmettelijke periode	Patiënten zijn besmettelijk voor de mug gedurende de koorts. Na het bloedmaal vindt virusrepletie plaats in de mug gedurende zeven tot veertien dagen.
Reservoir	Mens-mug (<i>Aedes</i>)-cyclus.
Besmettingsweg	Indirect via de steek van de overdag actieve mug <i>Ae. aegypti</i> en in mindere mate <i>Ae. albopictus</i> in stedelijke gebieden.
Risicogroepen	Reizigers naar gebieden waar dengue voorkomt.
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	Niet van toepassing, tenzij in Europa opgelopen.
2. Contactopsporing	Niet van toepassing.
3. (Chemo)proylaxe	Niet van toepassing.
4. Wering	Dengue is niet van mens op mens overdraagbaar. Wering is niet van toepassing.
Meldingsplichtig	Ja, Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven