



DE CE ȘI CUM SE EFECTUEAZĂ INVESTIGAREA PERSOANELOR DE CONTACT?

Sunt examinați oamenii din anturajul apropiat al pacientului contagios pentru a afla dacă aceștia au fost infectați sau dacă ei înșiși sunt bolnavi. Investigația cuprinde **un test cutanat la tuberculină, o radiografie toracică sau ambele.**

Oamenii din anturajul unui persoane bolnave sunt de asemenea examinați pentru a descoperi sursa de infecție. O asistentă, împreună cu persoana infectată, vor întocmi o listă cu persoanele cu care el sau ea a intrat frecvent în contact în ultima lună: membrii familiei, prieteni, colegi, colegi de clasă, membrii unei asociații sau ai unui club de agrement.



DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE INFORMAȚII?

Adresați-vă medicului dumneavoastră.

Accesați www.zorg-en-gezondheid.be sau contactați agenția „Zorg en Gezondheid” din regiunea dumneavoastră:

- \ Anvers: 03 224 62 04
- \ Limburg: 011 74 22 40
- \ Flandra de Est: 09 276 13 80
- \ Brabantul Flamand: 016 66 63 50
- \ Flandra de Vest: 050 24 79 00

Accesați www.vrgt.be sau luați legătura cu „Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding” (Asociația flamandă de asistență medicală pentru bolile respiratorii și tuberculoză) (VRGT) din regiunea dumneavoastră:

- \ Anvers:
Berchem: 03 287 80 10 – Turnhout: 014 41 13 62
- \ Limburg: 011 22 10 33
- \ Flandra de Est: 09 225 22 58
- \ Brabantul Flamand: 016 33 25 25
- \ Flandra de Vest: 059 70 26 85

Resp. ed.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid – 11/2014

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Vlaanderen
is zorg



TUBERCULOZĂ

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Tuberculoza este o boală infecțioasă cauzată de bacilul tuberculos sau bacilul Koch. Boala care de obicei apare în forma tuberculozei pulmonare afectează uneori și rinichii, oasele, creierul, glandele sau alte organe.

CUM DEVENIȚI INFECTAT?

Tuberculoza se răspândește practic aproape întotdeauna **prin aer**. Bacilul tuberculos este eliminat în aer când o persoană care suferă de tuberculoză pulmonară contagioasă tușește, vorbește sau strănută. Oamenii din apropiere pot inspira bacteria. Dacă bacteria pătrunde în plămâni, poate cauza o mică infecție a acestora care de obicei se vindecă în mod spontan, dar poate să fie transmisă altor indivizi.

Bacteria poate, de asemenea, să circule **prin sânge sau vasele limfatice** și să ajungă la alte organe (rinichi, oase, creier, glande...). Tuberculoza nu se transmite aproape niciodată prin obiecte (tacâmuri, haine, cărți, așternuturi...).



CINE POATE CONTACTA TUBERCULOZA?


Oricine poate contacta tuberculoza. Totuși, copii mici și oamenii cu o rezistență scăzută a organismului sunt mai sensibili la boală.

CARE SUNT SIMPTOMELE?

Cele mai frecvente simptome ale tuberculozei pulmonare active sunt:

- \ tuse persistentă, deseori cu flegmă
- \ pierderea poftei de mâncare
- \ scăderea în greutate
- \ dureri în piept
- \ febră (ridicată)
- \ transpirații nocturne
- \ oboseală

S-ar putea ca nu toate simptomele să apară în același timp. S-ar putea ca unele persoane să nu aibă niciuna din aceste simptome, și totuși să sufere de tuberculoză.



POATE FI VINDECATĂ TUBERCULOZA?

Da, boala poate fi vindecată complet. Tratamentul constă de obicei din trei sau patru medicamente (antibiotice).

Aceste antibiotice trebuie luate cel puțin șase luni, deoarece bacteria este greu de distrus. Nerespectarea întocmai a tratamentului poate să conducă la recidivă. Există posibilitatea ca tratamentul să devină mai dificil dacă bacteria devine rezistentă la antibioticele obișnuite.

CÂND SUNTEȚI CONTAGIOS PENTRU ALȚI OAMENI?

Sunteți contagios atunci când bacilul tuberculos este prezent în flegma dumneavoastră (tuberculoză pulmonară contagioasă). Dacă bacilul tuberculos nu este prezent, boala se numește tuberculoză pulmonară necontagioasă. Infecția tuberculoasă a altor organe (în afara plămânilor) nu este contagioasă.

Dacă urmați în mod corespunzător tratamentul timp de câteva săptămâni, tusea și caracterul contagios se reduc, dar boala încă nu este vindecată. De asemenea, igiena corespunzătoare a tusei reduce riscul de a infecta alți oameni: trebuie să tușiți întotdeauna într-un șervețel de hârtie, ținându-vă mâna în fața gurii, și cu fața întoarsă de la alți oameni. Aruncați șervețelul într-un coș de gunoi și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun lichid.