



Enkele veelgestelde vragen over de HPV-vaccinatie

Wie kan gratis ingeënt worden?

Het gratis vaccin tegen HPV wordt jaarlijks aangeboden aan alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen. Meisjes vanaf het tweede jaar secundair onderwijs kunnen wel gevaccineerd worden door de huisarts, maar niet met de gratis vaccins en niet door het CLB. Voor hen is er een gedeeltelijke terugbetaling als het vaccin op voorschrift gekocht wordt in de apotheek.

Is vaccinatie zinvol voor jongens?

Ook als jongen kan je je laten inenten door een arts naar keuze. Ook dat is nuttig maar omdat het risico op kankers door HPV kleiner is voor jongens dan voor meisjes, biedt de Vlaamse overheid momenteel geen gratis vaccin aan voor jongens. Er is ook geen gedeeltelijke terugbetaling voor jongens als het vaccin op voorschrift gekocht wordt in de apotheek. Sommige mutualiteiten bieden echter wel een gedeeltelijke terugbetaling aan voor HPV-vaccins voor jongens.



Waarom zijn er twee inenting nodig?

Na één inenting maakt je lichaam nog niet voldoende afweerstoffen aan om goed en langdurig beschermd te zijn tegen een besmetting met de HPV types. Bij de tweede inenting wordt de afweerreactie versterkt, waardoor je voldoende beschermd bent. Stoppen na één inenting is niet gevaarlijk, maar je bent dan niet voldoende beschermd tegen het virus.

Hoe groot is de kans dat je ooit een HPV-infectie oploopt?

Die kans is groot. Meer dan 80% van de niet gevaccineerde mensen loopt vroeg of laat een HPV-infectie op. Meestal merken ze daar niets van. Het virus wordt het meest verspreid op vrij jonge leeftijd.



Meer weten? Surf naar www.laatjevaccineren.be.

Voor meer informatie kun je ook altijd terecht bij **de huisarts of het CLB**.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL

WWW.ZORG-EN-GEZONDHEID.BE




Vlaanderen
is zorg



TWEE PRIKJES NU KUNNEN JE LATER VEEL LEED BESPAREN

Gratis inenting tegen HPV-infecties voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen.

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID



HPV, wat is dat eigenlijk?

HPV (humaan papillomavirus) is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer dan 100 types bestaan. Sommige types kunnen op lange termijn kankers veroorzaken, waaronder vooral baarmoederhalskanker. Gelukkig verdwijnen de meeste infecties vanzelf en leidt niet elke infectie tot kanker. Twee andere HPV-types veroorzaken wratten bij de aars en geslachtsdelen. Al die HPV-types verspreiden zich via intiem en seksueel contact.



“Als mama heb ik een vraag over HPV-vaccinatie.”

Waarom moet mijn dochter nu al gevaccineerd worden?


De inenting heeft het meeste effect als je nog niet met het virus in aanraking bent geweest. Besmetting met HPV is mogelijk door intiem en seksueel contact. Je dochter kan de inenting dus het best krijgen als ze nog niet seksueel actief is. Daarom wordt de vaccinatie op jonge leeftijd aanbevolen.



“Ik ben 12 jaar en wil graag iets weten.”


Hoe krijg ik die vaccins en doen ze pijn?

De vaccins worden in de bovenarm ingespoten. Of het pijn doet of niet, hangt van persoon tot persoon af. Sommigen voelen bijna niets van de prik, anderen vinden het wel wat pijnlijk. Achteraf kan de plaats waar het spuitje gegeven is, wat rood en pijnlijk zijn, maar dat gaat vanzelf over.




Wat kan je nu al doen om je te beschermen?

Tegen de types van HPV die de meeste gevallen (90%) van baarmoederhalskanker en genitale wratten veroorzaken, kun je je laten inenten. De Vlaamse overheid biedt hiervoor gratis vaccins aan voor alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs (±12 jaar). Volledige vaccinatie bestaat uit twee prikken in de loop van één schooljaar. Ze kunnen gegeven worden door de CLB's (centra voor leerlingenbegeleiding) of door een arts naar keuze. In dat laatste geval moet je wel een raadpleging betalen.



Zijn de vaccins veilig?

Ja, de vaccins zijn veilig. De plaats waar de prik gegeven werd, kan tijdelijk wat rood en pijnlijk zijn. In zeldzame gevallen kun je achteraf tijdelijk wat last hebben van buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, moeheid of koorts.



Wat moet ik nog weten?

Omdat het vaccin niet beschermt tegen alle types HPV, blijft het belangrijk om vanaf 25 jaar om de drie jaar een baarmoederhalsuitstrijkje te laten nemen door je arts.

Ook veilig vrijen blijft belangrijk als bescherming tegen HPV en andere seksueel overdraagbare infecties. Condoomgebruik beschermt echter niet volledig tegen HPV, dus vaccinatie is belangrijk.