

Samenvatting richtlijn: Q-koorts

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	<ul style="list-style-type: none"> > Acute Q-koorts: koorts, moeheid, hoofdpijn, nachtzweeten, kortademigheid, algemene malaise en spierpijn. 60% van de gevallen kent een asymptomatisch verloop. Ernstiger gevallen met pneumonie of hepatitis. > Chronische Q-koorts: bij 1-3% van de patiënten en uit zich vooral als een endocarditis. Niet meldingsplichtig.
Diagnose	<p>Acute Q-koorts:</p> <ul style="list-style-type: none"> > PCR (enkel in vroege fase; eerste 2 weken) in serum, respiratoire materialen (sputum, keeluitstrijk) en zwangerschapsproducten. > Serologisch via IF: specifieke IgM antistoffen fase II, seroconversie of viervoudige stijging van specifieke IgG-antistoftiter fase II (interval ≥ 2 weken).
Incubatieperiode	De incubatieperiode varieert van 7 tot 32 dagen (mediaan 18 dagen).
Besmettelijke periode	Slechts sporadisch overdraagbaar van persoon op persoon.
Reservoir	Zoönose: vooral herkauwers (schapen, geiten en runderen), maar ook ratten, konijnen, honden, katten, paarden en vogels.
Besmettingsweg	Aerogeen via aerosolen afkomstig uit placenta en vruchtwater van besmette dieren.
Risicogroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Omwonenden (2km) van een besmet geiten- of schapenbedrijf > Beroepsziekte: veehouders, dierenartsen en laboratoriummedewerkers die werken met geïnfecteerde dieren of weefselkweken, veehandelaren en medewerkers in dierentuinen, kinderboerderijen en dierenwinkels, medewerkers in een abattoir, in de vleesverwerkende industrie en de wolbewerkingindustrie
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	Inventarisatie van mogelijke bronnen via vragenlijst van Zorg en Gezondheid (expositie voorbij 4 weken).
2. Contactopsporing	Niet van toepassing.
3. (Chemo)profylaxe	Niet van toepassing.
4. Wering	Niet van toepassing.
Meldingsplichtig	Ja, Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven