

België

Hepatitis C – De ziekte kan uitgeroeid worden

Een [onderzoek](#) van Sciensano geeft aan dat er in België minder mensen besmet zijn met het hepatitis C-virus (HCV) dan eerder werd beschreven. Het onderzoek werd uitgevoerd op 3.209 stalen die representatief zijn voor de algemene Belgische bevolking, en geeft een prevalentie aan van 0,12% (95% IC: 0,03–0,41), terwijl deze eerder geraamd werd op [0,6% \(95% IC: 0,2–0,7\)](#). De laatste jaren is grote vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van geneesmiddelen voor hepatitis C, dat momenteel relatief goed genezen kan worden, ook al blijft de behandeling duur. Tot januari 2019 kwamen alleen patiënten in een vergevorderde staat van de ziekte in aanmerking voor terugbetaling van hun behandeling. Nu heeft de federale regering beslist om deze terugbetaling uit te breiden tot alle personen die besmet zijn met het HCV. De conclusies van het onderzoek bieden hoop voor het behalen van de doelstelling van de [WGO om hepatitis C tegen 2030](#) uit te roeien.

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) – Nieuwe aanbevelingen voor de behandeling van gonorrhoe en syfilis

In april publiceerde het KCE een [richtlijn](#) met betrekking tot de diagnose en behandeling van gonorrhoe en syfilis. Deze richtlijn is de eerste in zijn soort voor huisartsen en bundelt al de recente evidentie en expert opinie. In de komende maanden zal er voor huisartsen een praktisch hulpmiddel met betrekking tot seksuele gezondheid beschikbaar worden gesteld. Domus Medica was verantwoordelijk voor de chlamydia-richtlijn. Dit zal weldra afzonderlijk worden gepubliceerd op <https://www.ebpnet.be>. Deze richtlijnen moeten de huisartsen ondersteunen in het management van SOA's. Hun rol is immers zeer belangrijk in het inperken van de voortdurende toename van SOA's en de opkomende resistentie van gonorrhoe.

Vaccinatie – Basisschema, advies van de Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aanbeveling gedaan met betrekking tot het [basisvaccinatieschema](#) voor gezonde kinderen die 'à terme' geboren zijn, maar ook voor adolescenten en volwassenen. Daarbij wordt voorgesteld om de tweede vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella (MBR) te vervroegen tot de leeftijd van 7-9 jaar. Momenteel blijft het tweede vaccinatiemoment voor Vlaanderen ongewijzigd in het vijfde leerjaar of op de leeftijd van 10 jaar. Zorg en Gezondheid bekijkt wanneer we een vervroeging zouden doorvoeren en op welke leeftijd. Verder, zijn er ook veranderingen in de vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen op basis van nieuwe overheidsopdrachten door Zorg en Gezondheid voor de leveringen van de vaccins. Veranderingen zijn: vervanging vanaf 1 juli 2019 van Synflorix® door Prevenar 13® voor vaccinatie van baby's (jonger dan 2 jaar) tegen pneumokokken en uitbreiding vanaf september 2019 van de vaccinatie tegen HPV voor jongens in met het vaccin Gardasil 9®. Voor informatie over vaccinaties en de vaccinatieweek, zie <https://www.laatjevaccineren.be/>.

Wereld

Dengue – Epidemie op het eiland La Réunion

Sinds begin 2018 woedt op het eiland La Réunion een [dengue](#)-epidemie van ongebruikelijke omvang. In 2018 werden in totaal 6.770 gevallen gemeld. De circulatie van het virus werd in de winter niet onderbroken en het aantal gevallen is sinds begin 2019 terug beginnen stijgen, met per 31 maart ongeveer 5.000 gevallen, waaronder vijf doden. Deze trend zal zich naar verwachting de komende weken voortzetten. DENV-2 is het serotype dat de ronde doet. Er werden echter ook vier inheemse gevallen van het serotype DENV-1 gedetecteerd. De co-circulatie van deze twee serotypen kan de intensiteit van de epidemie en het aantal gevallen van hemorragische koorts verhogen, aangezien de bevolking niet immuun is voor het serotype DENV-1. In Europa is het [risico van overdracht](#) gekoppeld aan de invoer van het virus door viremische reizigers naar landen waar de competente virusvectoren (*Ae. albopictus* in het Middellandse Zeegebied en *Ae. aegypti* op het eiland Madeira) aanwezig zijn. Met deze ziekte moet rekening worden gehouden bij de differentiaal diagnose indien compatibele symptomen zich voordoen bij mensen die terugkeren van een reis naar het eiland La Réunion.

Ebola – Epidemiologische update van de Ebola-epidemie in de DRC

Op 23 april 2019 waren er 1.367 gevallen bekend, waarvan er 885 zijn overleden. Dit maakt van [deze epidemie](#) de tweede grootste Ebola-epidemie. 90 van deze gevallen zijn professionals uit de gezondheidszorg (6,6%). Meer dan 100.000 mensen werden gevaccineerd en de [voorlopige resultaten](#) met betrekking tot de vaccinale efficiëntie van het rVSV-ZEBOV-GP duiden op een efficiëntie van het vaccin van 97,5% op 10 dagen. Het vaccin heeft ook geleid tot een daling van het wereldwijde sterftecijfer bij gevaccineerde personen die de ziekte hebben ontwikkeld. De situatie in de DRC blijft alarmerend want het aantal gevallen blijft stijgen. Momenteel zijn er 22 gezondheidszones in twee provincies getroffen, waaronder Butembo, een grote stad in Noord-Kivu met meer dan een miljoen inwoners. [Het Noodcomité voor de Internationale Gezondheidsregeling](#), dat door de WGO op 12 april werd bijeengeroepen, stelt dat de huidige epidemie geen internationale noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vormt, omdat het risico op invoering en verspreiding van het virus op wereldniveau laag is, ook al is het potentiële risico van verspreiding naar de buurlanden (Rwanda, Zuid-Soedan en Oeganda) groot. Volg [hier](#) de meest recente cijfers met betrekking tot de epidemie.