

ЧТО ТАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ?

Лица, находящиеся в контакте больным открытой формой туберкулеза, должны быть обследованы, чтобы их заражение от больного палочкой Коха или заболевание туберкулезом. Обследование включает кожный туберкулиновый тест и/или флюорографию органов грудной клетки.

Лица, составляющие ближайшее окружение, должны быть обследованы также и с целью выявления возможного источника инфекции.



За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему врачу.

Визит www.zorg-en-gezondheid.be или контакт Уход и Здоровье в провинции:

- \ Антверпен: 03 224 62 04
- \ Лимбург: 011 74 22 40
- \ Оост-Влаандерен: 09 276 13 80
- \ Влаамс-Брабан: 016 66 63 50
- \ Вест-Влаандерен: 050 24 79 00

Визит www.vrgt.be или контакт Фламандской ассоциации по борьбе с туберкулезом и заболеваниями дыхательных путей (ФАБТЗДП) в провинции:

- \ Антверпен:
Берхем: 03 287 80 10 - Турнхоут: 014 41 13 62
- \ Лимбург: 011 22 10 33
- \ Оост-Влаандерен: 09 225 22 58
- \ Влаамс-Брабан: 016 33 25 25
- \ Вест-Влаандерен: 059 70 26 85

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014



Vlaanderen
is zorg

КОЖНЫЙ ТУБЕРКУЛИНОВЫЙ ТЕСТ

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Кожный туберкулиновый тест (интрадермальная реакция Манту) проводится, чтобы определить, является ли пациент носителем бактерий, вызывающих туберкулез (палочек Коха). В большинстве случаев болезнь принимает форму туберкулеза легких, однако иногда она может поражать почки, кости, головной мозг, лимфатические узлы и другие органы.

КАК ПРОВОДИТСЯ КОЖНЫЙ ТУБЕРКУЛИНОВЫЙ ТЕСТ?

Небольшое количество раствора (туберкулина) вводится подкожно в предплечье пациента. Проверка результата проводится через 3-5 дней.

Кожный туберкулиновый тест не представляет никакой опасности для пациентов, в т.ч. – для маленьких детей и беременных женщин.



РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЕН

Если при проверке результата на коже пациента не обнаруживается никакой реакции на введение туберкулина, это обычно означает, что он не заражен туберкулезной палочкой. В ряде случаев таким пациентам рекомендуется повторное проведение теста через 2 месяца.

РЕЗУЛЬТАТ НЕ ОПРЕДЕЛЕН

Кожная реакция может представлять собой маленькую, бледно окрашенную выпуклость на коже. Если результат теста не определен, необходимо его повторное проведение (обычно – через 2 месяца).

РЕЗУЛЬТАТ ПОЛОЖИТЕЛЕН

Если реакция принимает форму плотной припухлости диаметром сравнимой с шириной предплечья, это означает, что пациент заражен туберкулезом.

Если у пациента выявлена положительная реакция на кожный туберкулиновый тест, необходимо флюорографическое обследование легких, чтобы определить, имеются ли клинические проявления туберкулеза. Если флюорография не выявляет патологических изменений, то пациент является носителем палочки Коха, но болезнь не развивается. Такой пациент не является заразным для окружающих.

В ряде случаев, врач рекомендует таким пациентам в течение 6-9 месяцев принимать определенные лекарства. Это позволяет снизить риск развития заболевания в будущем примерно на 80%.

Если при флюорографическом исследовании выявляются признаки туберкулеза, необходимо начать лечение. Пациент должен будет регулярно принимать 3 или более медицинских препарата в течение не менее чем 6 месяцев.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КОЖНЫЙ ТУБЕРКУЛИНОВЫЙ ТЕСТ

