

WAT IS EEN CONTACTONDERZOEK?

Personen uit de onmiddellijke omgeving van een besmettelijke patiënt worden onderzocht om na te gaan of ze besmet of ziek zijn. Dat gebeurt **via een tuberculinehuidtest, een longfoto of beide.**

Personen uit de omgeving van een zieke worden ook onderzocht om de ziektebron op te sporen.



MEER WETEN?

Raadpleeg je arts.

Surf naar www.zorg-en-gezondheid.be of neem contact op met Zorg en Gezondheid in je provincie:

- \ Antwerpen: 03 224 62 04
- \ Limburg: 011 74 22 40
- \ Oost-Vlaanderen: 09 276 13 80
- \ Vlaams-Brabant: 016 66 63 50
- \ West-Vlaanderen: 050 24 79 00

Surf naar www.vrgt.be of neem contact op met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) in je provincie:

- \ Antwerpen:
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- \ Limburg: 011 22 10 33
- \ Oost-Vlaanderen: 09 225 22 58
- \ Vlaams-Brabant: 016 33 25 25
- \ West-Vlaanderen: 059 70 26 85

v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Vlaanderen
is zorg

TUBERCULINEHUIDTEST

voor het opsporen van tuberculose


AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Een tuberculinehuidtest (Mantoux-test of intradermotest) toont aan of je besmet bent met de tuberkelbacterie of de bacil van Koch. Die bacterie veroorzaakt tuberculose. De meest voorkomende vorm van de ziekte is longtuberculose. Soms worden ook de nieren, beenderen, hersenen, klieren of andere organen aangetast.

HOE WORDT DE TEST UITGEVOERD?

Er wordt een kleine hoeveelheid vloeistof (tuberculine) in de huid van de voorarm ingespoten. Enkele dagen na de test wordt het resultaat gecontroleerd.

De tuberculinehuidtest is niet gevaarlijk en mag ook uitgevoerd worden bij jonge kinderen of zwangere vrouwen.



HET RESULTAAT IS NEGATIEF

Als er bij de controle van de test **geen duidelijke reactie** voelbaar is op de arm, dan ben je hoogstwaarschijnlijk niet besmet met de tuberkelbacterie.

Soms is het nodig om na twee maanden een controletest uit te voeren.

HET RESULTAAT IS TWIJFELACHTIG

Als er bij de controle een **lichte en kleine verhevenheid** voelbaar is op de arm, is het niet duidelijk of je al dan niet besmet bent.

Bij een twijfelachtig resultaat volgt altijd een nieuwe test (meestal na twee maanden).

HET RESULTAAT IS POSITIEF

Als er bij de controle een **duidelijke verhevenheid en verharding** van de huid voelbaar is, ben je besmet.

Bij een positieve tuberculinehuidtest wordt een **longfoto** genomen om na te gaan of je tuberculose hebt ontwikkeld. Is de longfoto normaal, dan ben je besmet maar niet ziek en ook niet besmettelijk voor anderen.

In bepaalde gevallen kun je het best gedurende zes à negen maanden één geneesmiddel innemen. Daardoor daalt het risico op een latere ontwikkeling van tuberculose met ongeveer 80 %.

Als er op de longfoto letsels van tuberculose zichtbaar zijn, moet je starten met een behandeling. Je moet dan gedurende minstens zes maanden zeer stipt drie of meer geneesmiddelen innemen.

POSITIEVE TUBERCULINEHUIDTEST

